

附件 2

非处方药说明书范本

1. 疏清颗粒

疏清颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：疏清颗粒

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治] 清热解毒，宣泄肺胃。用于小儿急性上呼吸道感染属风热证，证见：发热、鼻塞、咽痛、流涕、口渴、咳嗽、汗出、舌红或苔薄黄。

[规格] 每袋装 3 克

[用法用量] 开水冲服。1 岁以下，一次 3 克；1~3 岁，一次 6 克；4~6 岁，一次 9 克；7 岁以上，一次 12 克；一日 3 次。

[不良反应] 监测数据显示，本品有恶心、呕吐、腹泻、皮疹等不良反应报告。

[禁忌]

1. 肝功能严重损害者禁用。
2. 对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

1. 本品宜饭后服用，禁与茶及含鞣酸类药合用，忌辛辣生冷油腻食物。
2. 风寒感冒者不适用，表现为恶寒发热，无汗、咳嗽、喉痒、流清涕、咽不红。
3. 按照用法用量服用，服药 3 天症状无改善或服药期间症状加重者，应及时就医。
4. 体温超过 38.5℃ 应及时就医。
5. 脾胃虚弱，大便稀溏者慎用。
6. 体弱者慎用。
7. 有心脏病、肾病等疾病应在医师指导下服用。
8. 对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用] 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称:

生产地址:

邮政编码:

电话号码:

传真号码:

网 址:

如有问题可与生产企业联系。

2.消疲灵颗粒

消疲灵颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：消疲灵颗粒

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]益气活血，养血安神，消除疲劳，恢复体力。用于过度疲劳引起的心悸气短，四肢酸痛，全身无力，神经疲惫，烦躁失眠，食欲不振和病后体质虚弱。

[规格] 每袋装 6 克（无蔗糖）

[用法用量] 开水冲服，一次 1~2 袋，一日 1~3 次，6 天为一疗程。

[不良反应]监测数据显示，本品有恶心、呕吐、腹胀、腹部不适、腹泻、便秘、皮疹、发热、胸闷、头晕等不良反应报告。

[禁忌]

1.孕妇禁用。

2.感冒发烧、上呼吸道感染者禁服。

3.对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

1.体实有热者慎服。

2.本品宜饭前服用，服药期间忌食辛辣、生冷、油腻食物。

3.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。

4.服药 6 天症状无缓解，应去医院就诊。

5.严格按照用法用量服用，本品不宜长期服用。

6.儿童应在医师指导下服用。

7.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8.本品性状发生改变时禁止使用。

9.儿童必须在成人监护下使用。

10.请将本品放在儿童不能接触的地方。

11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

3.七叶神安分散片

七叶神安分散片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：七叶神安分散片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]益气安神。用于心气不足所致的心悸、失眠。

[规格]每片重 0.28 克（含三七叶总皂苷 50 毫克）

[用法用量] 口服，一次 1~2 片，一日 3 次。饭后服或遵医嘱。

[不良反应]监测数据显示，本品有恶心、腹部不适、腹痛、腹泻、皮疹、瘙痒、头晕、头痛等不良反应报告。

[禁忌]对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

1.忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

2.服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。

3.感冒发热病人不宜服用。

4.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。

5.儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

6.服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。

7.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8.本品性状发生改变时禁止使用。

9.儿童必须在成人的监护下使用。

10.请将本品放在儿童不能接触的地方。

11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

注册地址：

电子邮件：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

4. 翘梳牙痛颗粒

翘梳牙痛颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：翘梳牙痛颗粒

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治] 清热泻火，消肿止痛。用于风火牙痛和胃火牙痛，症见牙齿疼痛，牙龈红肿。

[规格] 每袋装 15 克

[用法用量] 开水冲服。一次 15 克，一日 3 次。

[不良反应] 监测数据显示本品有过敏反应个例报告。

[禁忌]

1. 对本品及所含成份过敏者禁用。
2. 本品含蔗糖，糖尿病患者禁用。

[注意事项]

1. 忌食烟酒、辛辣、油腻食物。
2. 运动员慎用。
3. 孕妇慎用，且应在医师指导下服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等患者应在医师指导下服用。
5. 儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
6. 服药时最好配合口腔科治疗，急性牙髓炎、牙痛重症患者，全身性疾病所致牙痛，应在医师指导下服用。
7. 如症状严重应及时去医院就诊，以免延误治疗。
8. 连续用药时间不宜超过 3 天，服用期间症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

[药物相互作用] 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

5.藿香正气胶囊

藿香正气胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：藿香正气胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，胸膈痞闷，脘腹胀痛，呕吐泄泻。

[规格] 每粒装 0.5 克

[用法用量] 饭前空腹服。一次 2 粒，一日 2 次。

[不良反应]监测数据显示，本品有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、口干、便秘、皮疹、瘙痒、头晕、心悸、潮红、呼吸困难、过敏或过敏样反应等不良反应报告。

[禁忌]对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

- 1.饮食宜清淡。
- 2.不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- 3.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
- 4.儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
- 5.吐泻严重者应及时去医院就诊。
- 6.服药三天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。
- 7.按照本品说明书用法用量服用，不宜过量或长期服用。
- 8.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 9.本品性状发生改变时禁止使用。
- 10.儿童必须在成人监护下使用。
- 11.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 12.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

6.十滴水胶丸

十滴水胶丸说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：十滴水胶丸

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]健胃，驱风。用于因中暑而引起的头晕，恶心，腹痛，胃肠不适。

[规格] 每粒装 0.25 克

[用法用量] 口服，一次 4 粒。

[不良反应]本品有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头晕、头痛、失眠、心慌、过敏反应等不良反应报告。

[禁忌]

1.孕妇忌服。

2.对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

1.饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。

4.儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5.严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8.本品性状发生改变时禁止使用。

9.儿童必须在成人监护下使用。

10.请将本品放在儿童不能接触的地方。

11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网址：

如有问题可与生产企业联系。

7.雪梨止咳糖浆

雪梨止咳糖浆说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：雪梨止咳糖浆

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]润肺，止咳，化痰。适用于支气管炎，咳嗽，咳痰。

[规格]

[用法用量] 口服，一次 10~15 毫升，小儿一次 5~7.5 毫升，一日 3~4 次。

[不良反应]监测数据显示，本品有腹痛、腹胀、腹泻、口干、呕吐等不良反应报告。

[禁忌]

1.糖尿病患者禁用。

2.对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

1.服用 3 天后症状未见缓解，应去医院就诊。

2.若出现发烧，或喘促气急，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

3.高血压、心脏病、肝病、肾病等患者应在医师指导下服用。

4.儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下使用。

5.严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。

6.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7.本品性状发生改变时禁止使用。

8.儿童必须在成人监护下使用。

9.请将本品放在儿童不能接触的地方。

10.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

8. 复方益母胶囊

复方益母胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：复方益母胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治] 活血行气，化瘀止痛。用于气滞血瘀证所致的痛经。症见月经期小腹胀痛拒按，经血不畅，血色紫黯成块，乳房胀痛，腰部酸痛。

[规格] 每粒装 0.42 克

[用法用量] 口服，一次 5 粒，一日 2 次，月经来潮前 2 天开始服用，7 天为一疗程。

[不良反应] 监测数据显示，复方益母制剂有恶心、呕吐、腹泻、腹痛、瘙痒、皮疹、头晕等不良反应报告。

[禁忌]

1. 对本品及所含成份过敏者禁用。

2. 孕妇及月经过多者忌服。

[注意事项]

1. 经期忌生冷饮食，不宜洗凉水澡。

2. 气血亏虚所致的痛经不宜选用，其表现为经期或经后小腹隐痛喜按。

3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。

4. 痛经伴有其他疾病者应在医师指导下服用。

5. 如有生育要求应在医师指导下服用。

6. 服药后痛经不减轻，或重度痛经者，应到医院诊治。

7. 按用法用量服用，长期服用应向医师咨询。

8. 对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用] 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

9. 抗菌消炎胶囊

抗菌消炎胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：抗菌消炎胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治] 清热、泻火、解毒。用于风热感冒，咽喉肿痛，实火牙痛。

[规格] 每粒装 0.52 克

[用法用量] 口服。一次 2~4 粒，一日 3 次，儿童酌减。

[不良反应] 监测数据显示，抗菌消炎制剂有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、胸闷、心悸、过敏反应等不良反应报告。

[禁忌] 对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
5. 发烧体温超过 38.5℃ 的患者，应去医院就诊。
6. 服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。
7. 小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。
8. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。
9. 服药后如发生不良反应，应去医院就诊。
10. 对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。
11. 本品性状发生改变时禁止使用。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用] 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

10.六味地黄咀嚼片

六味地黄咀嚼片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：六味地黄咀嚼片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精。

[规格] 每片重 1.0 克（每 3 片相当于原生药材 5 克）

[用法用量] 嚼服。一次 3 片，一日 2 次。

[不良反应]监测数据显示，六味地黄制剂有口干、恶心、呕吐、厌食、腹胀、腹痛、腹泻、皮疹、瘙痒、过敏或过敏样反应等不良反应报告。

[禁忌]

1.对本品及所含成份过敏者禁用。

2.感冒发热患者禁用。

[注意事项]

1.忌辛辣、不易消化食物。

2.不宜在服药期间服感冒药。

3.服药期间出现食欲不振、胃脘不适、大便稀、腹痛等症状时，应去医院就诊。

4.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。

5.按照用法用量服用，孕妇应在医师指导下服用。

6.服药两周症状无缓解，应去医院就诊。

7.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8.本品性状发生改变时禁止使用。

9.请将本品放在儿童不能接触的地方。

10.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

11.百令片

百令片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：百令片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]补肺肾，益精气。用于肺肾两虚引起的咳嗽、气喘、腰背酸痛等症及慢性支气管炎的辅助治疗。

[规格] 每片重 0.44 克

[用法用量] 口服。一次 3-9 片，一日 3 次。

[不良反应]监测数据显示，本品有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、便秘、口干、瘙痒、皮疹、头痛、头晕等不良反应报告。

[禁忌]对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

- 1.忌不易消化食物。
- 2.感冒发热病人不宜服用。
- 3.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
- 4.儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。
- 5.服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。
- 6.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 7.本品性状发生改变时禁止使用。
- 8.儿童必须在成人监护下使用。
- 9.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 10.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

12. 芩连胶囊

芩连胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：芩连胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热解毒，消肿止痛。用于脏腑蕴热，头痛目赤；口鼻生疮，湿热带下，疮疖肿痛。

[规格] 每粒装 0.44 克

[用法用量] 口服。一次 4 粒，一日 2~3 次。

[不良反应]监测数据显示，本品有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、瘙痒、皮疹等不良反应报告。

[禁忌]

1.对本品及所含成份过敏者禁用。

2.中焦虚寒及阴虚热盛者禁用。

[注意事项]

1.忌烟、酒及辛辣食物。

2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。

4.素体虚弱者慎用。

5.孕妇慎用，且应在医师指导下服用。

6.服药后大便次数增多且不成形者，应酌情减量。

7.儿童、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

8.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

9.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10.本品性状发生改变时禁止使用。

11.儿童必须在成人监护下使用。

12.请将本品放在儿童不能接触的地方。

13.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网址：

如有问题可与生产企业联系。

13.葛根汤片

葛根汤片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：葛根汤片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]发汗解表，升津舒经。用于风寒感冒，症见：发热恶寒，鼻塞流涕，咳嗽咽痒，咯痰稀白，无汗，头痛身疼，项背强急不舒，苔薄白或薄白润，脉浮或浮紧。

[规格] 每片重 0.4 克

[用法用量] 口服。一次 6 片，一日 3 次。

[不良反应]监测数据显示，葛根汤制剂有皮疹、瘙痒、恶心等不良反应报告。

[禁忌]对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

- 1.忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
- 2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
- 3.感冒属外感风热症者不适用。
- 4.运动员慎用；运动员应在医师指导下使用。
- 5.心脏病及失眠、心悸患者慎用；高血压患者慎用且应在医师指导下使用。肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
- 6.儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
- 7.发烧体温超过 38.5℃ 的患者，应去医院就诊。
- 8.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
- 9.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 10.本品性状发生改变时禁止使用。
- 11.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 12.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

14.八珍片

八珍片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：八珍片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]补气益血。用于气血两虚，面色萎黄，四肢乏力。

[规格] 每片重 0.4 克

[用法用量] 口服，一次 3 片，一日 3 次。

[不良反应]监测数据显示，本品有恶心、呕吐、皮疹、瘙痒、口干等不良反应报告。

[禁忌]

- 1.对本品及所含成份过敏者禁用。
- 2.咳嗽痰多，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者忌服。

[注意事项]

- 1.孕妇慎用，且应在医师指导下服用。
- 2.本品宜饭前服用或进食同时服，不宜和感冒类药同时服用，不宜同时服用藜芦或其制剂。
- 3.本品为气血双补之药，性质较粘腻，有碍消化，故咳嗽痰多，脘腹胀痛，纳食不消，腹胀便溏者忌服。
- 4.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
- 5.儿童、哺乳期妇女及年老体虚者应在医师指导下服用。
- 6.按照用法用量服用，服药期间出现食欲不振，恶心呕吐，腹胀便溏等应去医院就诊。
- 7.服药 2 周无缓解，应去医院就诊。
- 8.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 9.本品性状发生改变时禁止使用。
- 10.儿童必须在成人监护下使用。
- 11.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 12.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

15.川贝枇杷胶囊

川贝枇杷胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：川贝枇杷胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热宣肺，化痰止咳。用于风热犯肺，内郁化火所致的咳嗽痰黄或吐痰不爽，咽喉肿痛，胸闷胀满，感冒咳嗽及慢性支气管炎见上述证候者。

[规格] 每粒装 0.2 克

[用法用量] 口服。一次 3 粒，一日 3 次。

[不良反应]监测数据显示，川贝枇杷制剂有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、皮疹、瘙痒、头晕等不良反应报告。

[禁忌]

1.孕妇禁用。

2.对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

1.忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3.风寒感冒者不适用。

4.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。

5.支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

6.儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

7.服药期间，若患者发烧体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。

8.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

9.当使用本品出现不良反应时，应停药并及时就医。

10.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11.本品性状发生改变时禁止使用。

12.儿童必须在成人监护下使用。

13.请将本品放在儿童不能接触的地方。

14.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址:

邮政编码:

电话号码:

传真号码:

网 址:

如有问题可与生产企业联系。

16.健脾糕片

健脾糕片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：健脾糕片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]开胃健脾。用于脾胃虚弱，身体羸瘦，食欲不振，大便稀溏。

[规格] 每片重 0.5 克

[用法用量] 嚼服，一次 8~12 片，一日 1~2 次。

[不良反应]监测数据显示，健脾糕片有恶心、呕吐、腹痛、腹胀等不良反应报告。

[禁忌]对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

- 1.饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。
- 2.不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。
- 3.感冒发热病人不宜服用。
- 4.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
- 5.孕妇慎用，并应在医师指导下服用。
- 6.儿童、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下服用。
- 7.便溏严重者，应去医院就诊。
- 8.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
- 9.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 10.本品性状发生改变时禁止使用。
- 11.儿童必须在成人监护下使用。
- 12.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 13.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。

17.六味补血胶囊

六味补血胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：六味补血胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]益气养血。用于气血两虚证，症见头晕眼花，神疲乏力，唇甲色淡等。

[规格] 每粒装 0.48 克

[用法用量] 口服，一次 5 粒，一日 3 次。

[不良反应]监测数据显示，六味补血制剂有恶心等不良反应报告。

[禁忌]

1.孕妇禁用。

2.对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

1.忌辛辣、生冷、油腻食物。

2.感冒发热病人不宜服用。

3.本品宜饭前服用。

4.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。

5.服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。

6.儿童应在医师指导下服用。

7.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8.本品性状发生改变时禁止使用。

9.儿童必须在成人监护下使用。

10.请将本品放在儿童不能接触的地方。

11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系。