

附件

保济口服液非处方药说明书范本

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：保济口服液

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治] 解表，祛湿，和中。用于腹痛吐泻，噎食暖酸，恶心呕吐，肠胃不适，消化不良，舟车晕浪，四时感冒，发热头痛。

[规格] 每瓶装 10 毫升

[用法用量] 口服。一次 10~20 毫升，一日 3 次；儿童酌减。

[不良反应] 监测数据显示，保济口服液有皮疹、瘙痒、腹泻等不良反应报告。

[禁忌]

- 1.孕妇忌服。
- 2.对本品及所含成份过敏者禁用。

[注意事项]

- 1.忌食生冷油腻不易消化食物。
- 2.不适用于急性肠道传染病之剧烈恶心、呕吐、水泻不止。
- 3.吞咽食物有噎感者，尽早到医院诊治。
- 4.服药三天后症状无改善，或症状加重者，应立即停药并去医院就诊。
- 5.小儿、年老体虚者，应在医师指导下服用。
- 6.哺乳期妇女慎用。
- 7.当使用本品出现不良反应时，应停药并及时就医。
- 8.对本品及所含成份过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9.本品性状发生改变时禁止使用。

10.儿童必须在成人监护下使用。

11.请将本品放在儿童不能接触的地方。

12.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系